

TORUPUHASTI



Vahend kanalistsiooni ummistuste kõrvaldamiseks ja ennetamiseks.

Ummistuse korral valdada torustikku 300-500 ml vahendit, lasta toimida 1,5-2 tundi. Vajadusel kauem. Seejärel uhta kuuma veega. Ummistuste ennetamiseks toimida samuti ca 200 ml vahendiga kuus. Ettevaatust leelis!

Sisaldab naatriumhüdroksiidi. Põhjustab tugevat söövitust. Hoida lastele kättesaamatult! Silma sattudes loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole, võimalusel näidata etiketti. Säilivusaega ei piirata.

ETTEVAATUST: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega (või loputada duši all). SISSEHINGAMISE KORRAL: hindamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Sisaldab: naatriumhüdroksiidi.

Koostisosad: Aqua, Sodium hydroxide.

TOOTE PAKEND: 1L ja 4L

